



# Échographie



## Examens d'intervention

### BIOPSIE ou PONCTION

Prélèvement d'un échantillon de tissu ou d'un liquide sous guidage échographique aux fins d'analyse microscopique.

### DRAINAGE

Examen réalisé sous échographie afin de retirer une certaine quantité de liquide afin de soulager la douleur et diminuer la pression causée par une présence anormale de liquide.

### IMPORTANT :

Ne cessez aucun médicament prescrit pendant cette préparation à moins d'indication contraire. (Attention aux anticoagulants tels Coumadin, Aspirine, Entrophen, Plavix.)

Vous devrez rester sous surveillance à la chirurgie d'un jour pendant environ trois heures après l'examen sauf pour la biopsie du sein et de la thyroïde. Le médecin radiologiste autorisera votre départ, normalement à la fin de l'après-midi.

Pour le patient insulinodépendant (diabétique) :

- Aviser notre personnel lors de la prise du rendez-vous.
- Prendre une collation en soirée, la veille de l'examen : jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apporter votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

### BIOPSIE ou PONCTION

**Durée : environ 30 à 45 minutes**

- **Biopsie des ganglions lymphatiques** sauf la région intra-abdominale ou intrathoracique

- **Biopsie osseuse**

- **Biopsie du sein**

Il est très important d'apporter vos films de mammographie si ceux-ci ont été réalisés dans un autre centre.

- **Ponction d'ascite**
- **Ponction pleurale**
- **Ponction de la thyroïde**

### PRÉPARATION :

- Un coagulogramme récent (moins de 3 mois) est nécessaire avant l'examen sauf pour la biopsie du sein et de la thyroïde. Votre médecin devrait avoir prescrit un coagulogramme si nécessaire. Si tel n'est pas le cas, présentez-vous au Service d'imagerie médicale pour la prise du rendez-vous.

- Non à jeun (repas léger).

- **Si vous prenez du « Coumadin » :**

- Votre médecin devra consulter le radiologiste avant l'examen.
- Un coagulogramme est nécessaire avant l'examen. Vous devrez vous présenter au moins **deux heures avant l'heure de la biopsie**.

- **Si vous prenez d'autres médicaments pour éclaircir le sang tels « Entrophen, Aspirine, Plavix » :**

- Cesser de prendre ces médicaments environ 7 jours avant l'examen. Vous devrez toutefois **avoir l'autorisation de votre médecin** avant de cesser toute médication.

- **Biopsie des ganglions lymphatiques de la région abdominale ou intrathoracique**

- **Biopsie hépatique**

- **Biopsie du pancréas**

- **Biopsie rénale**

- **Biopsie des surrénales**

- **Ponction abdominale**

### PRÉPARATION :

- Un coagulogramme récent (moins de 3 mois) est nécessaire avant l'examen. Votre médecin devrait avoir prescrit un coagulogramme. Si tel n'est pas le cas, présentez-vous au Service d'imagerie médicale pour la prise du rendez-vous.

- **À jeun** à partir de minuit.

- **Si vous prenez du « Coumadin » :**

- Votre médecin devra consulter le radiologiste avant l'examen.
- Un coagulogramme est nécessaire avant l'examen. Vous devrez vous présenter au moins **deux heures avant l'heure de la biopsie**.

- **Si vous prenez d'autres médicaments pour éclaircir le sang tels « Entrophen, Aspirine, Plavix » :**

- Cesser de prendre ces médicaments environ 7 jours avant l'examen. Vous devrez toutefois **avoir l'autorisation de votre médecin** avant de cesser toute médication.

suite ►