


Biopsie mammaire sous stéréotaxie



Prélèvement d'un échantillon
de tissu sous guidage
radiologique aux fins
d'analyse microscopique.

CONTRE INDICATION :



Problème de coagulation
(saignement anormal)

Si vous avez des problèmes de coagulation c'est-à-dire un temps de saignement anormal, vous devez aviser notre personnel immédiatement.

PRÉPARATION :

Avant l'examen :

- Si vous prenez du « Coumadin » :
 - Votre médecin devra consulter le radiologiste avant l'examen.
 - Un coagulogramme est nécessaire avant l'examen. Vous devrez vous présenter au moins **deux heures avant l'heure de la biopsie**.
- Si vous prenez d'autres médicaments pour éclaircir le sang tels « Entrophen, Aspirine, Plavix » :
 - Cesser de prendre ces médicaments environ 7 jours avant l'examen. Vous devrez toutefois **avoir l'autorisation de votre médecin** avant de cesser toute médication.
 - Un coagulogramme récent (moins de 3 mois) est nécessaire avant l'examen. Votre médecin devrait avoir prescrit un coagulogramme si nécessaire. Si tel n'est pas le cas, présentez-vous au Service d'imagerie médicale pour la prise du rendez-vous.

Le matin de l'examen :

- Prendre un déjeuner léger.
- Choisir de préférence un soutien-gorge de bon maintien le jour de l'examen.

IMPORTANT :

Ne cessez aucun médicament prescrit pendant cette préparation à moins d'indication contraire. (Attention aux anticoagulants tels le Coumadin, Aspirine, Entrophen, Plavix).

Vos films de la dernière mammographie sont nécessaires pour l'examen.

DURÉE :
environ 45 à 60 minutes