


Transit du grêle



Examen radiologique permettant de visualiser l'intestin grêle à l'aide d'un produit de contraste. Un liquide habituellement appelé « baryum » devra être bu au moment de l'examen afin de permettre la visualisation de l'intestin grêle. Des radiographies seront prises toutes les 15 minutes environ pour suivre le trajet du baryum dans l'intestin grêle.

CONTRE INDICATION :



**Oclusion
intestinale aiguë**

IMPORTANT :

Ne cessez aucun médicament prescrit pendant cette préparation sauf les médicaments qui ont tendance à constiper (ex. : Bentylool, Immodium).

Si vous devez prendre des comprimés le matin de l'examen, assurez-vous de les prendre au moins deux heures avant l'examen avec une très petite quantité d'eau.

Pour le patient insulinodépendant (diabétique) :

- Aviser notre personnel lors de la prise du rendez-vous.
- Prendre une collation en soirée, la veille de l'examen : jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apporter votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

Aucun examen récent utilisant du baryum ne doit précéder l'étude de l'intestin grêle. Attendez au moins une semaine entre les deux examens.

DURÉE :

L'examen peut durer entre une et trois heures. Le baryum doit parcourir l'intestin grêle en entier. En fait, il suit le temps de digestion de chaque individu. Ainsi, le temps d'examen variera d'un individu à l'autre. L'examen est long, mais il n'entraîne pas de douleur ni de malaise. Vous pouvez apporter de la lecture si vous le désirez.

PRÉPARATION :

La veille de l'examen :

- Cesser de manger à partir de minuit. Toutefois, vous pouvez boire jusqu'à minuit.
- À jeun à partir de minuit.

Après l'examen :

- Vous devrez boire beaucoup de liquide pour éliminer le baryum.