


Lavement baryté en simple contraste

ADULTE



Examen radiologique permettant de visualiser le gros intestin par introduction, à partir du rectum, d'une substance de contraste « baryum ».

IMPORTANT :

Ne cessez aucun médicament prescrit pendant cette préparation à moins d'indication contraire.

Si vous devez prendre des comprimés le matin de l'examen, prenez une petite quantité d'eau.

Cet examen ne doit pas être réalisé le même jour que la coloscopie ou la rectoscopie.

Pour le patient insulino-dépendant (diabétique) :

- Aviser notre personnel lors de la prise du rendez-vous.
- Prendre une collation en soirée, la veille de l'examen : jus de pomme, biscuits soda, fromage cheddar doux.
- Apporter votre médication si vous devez rester à jeun le matin de l'examen.

DURÉE : environ 30 minutes

PRÉPARATION :

ADULTE SEULEMENT

Les médicaments requis pour l'examen sont disponibles sans ordonnance médicale.

La veille de l'examen :

- **Dîner** : Repas liquide sans résidu (soupe claire ou bouillon, jello). Boire 225 ml (1 tasse) de liquide.
- **16 h** : 1 bouteille de Citro-Mag (300 ml). Si vous souffrez d'insuffisance rénale ou cardiaque, remplacez le Citro-Mag par 60 ml d'huile de Ricin dans du jus d'orange au moins une heure avant le souper.
- **Souper** : Repas liquide sans résidu (soupe claire ou bouillon, jello). Boire 225 ml (1 tasse) de liquide.
- **En soirée** : Prendre 2 comprimés de Bisacodyl 5 mg et boire 500 ml (2 tasses) de liquide.
- À jeun à partir de 22 h.

Le matin de l'examen :

- 1 suppositoire de Bisacodyl 10 mg. Attendre 10 à 15 minutes minimum avant d'aller à la selle.

Après l'examen :

- Boire beaucoup de liquide durant les prochaines 24 heures.